

ЧЕМ ВРЕДЕН АЛКОГОЛЬ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ?



Министерство здравоохранения Республики Казахстан
Национальный центр проблем формирования здорового образа жизни

Женщины, употребляющие спиртные напитки во время беременности, подвергают будущих детей серьезной опасности и проблемам со здоровьем. Одним из тяжелых нарушений является фетальный алкогольный синдром



риск самопроизвольного аборта


риск преждевременных родов

при рождении низкий вес и маленькая длина тела

отставание в росте и весе (до и после рождения)

пороки развития

нарушения со стороны центральной нервной системы



Нарушения центральной нервной системы:

отставание в умственном развитии

снижение памяти

сложности в обучении



повышенная возбудимость

заикание

судороги, тремор конечностей

уменьшение размеров головного мозга, нарушение размеров его отделов

Внешние признаки

(имеют специфическое строение лица):

мелкие глаза (короткая глазная щель)

маленькая голова

низкорасположенная плоская переносица

плоское лицо

уши расположены низко, имеют дополнительную складку в ушной раковине

сглаженность носогубной складки

укороченный, «вздёрнутый» нос

тонкая верхняя губа (практически незаметна)

короткий (недоразвитый) подбородок



Аномалии развития:

врожденные пороки сердца

пороки развития половой системы



недоразвитие внутренних органов

аномалии строения туловища, конечностей

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Алкоголь токсичен для развивающегося плода в течение всех девяти месяцев беременности!



ЖҮКТІЛІК КЕЗІНДЕ ІШІМДІК ІШУДІҢ ЗИЯНЫ ҚАНДАЙ?



Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі
Салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығы

Жүктілік кезінде спирттік ішімдікті тұтынатын әйелдер болашақ балаларының денсаулықтарын айтарлықтай қауіп-қатер мен қиындықтарға душар етеді. Денсаулықтың қатерлі бұзылуының бірі нәрестеге тән алкогольдік синдром болып табылады.

Орталық жүйке жүйесінің бұзылуы:

ақыл-ой дамуының артты қалуы

аса сезімталдық

есте сақтаудың төмендеуі

кекештену

оқуда қиналу

аяқ-қолдың құрысуы



мидың көлемінің кішіреюі, оның бөліктерінің көлемінің бұзылуы

Нәрестенің дамуының ауытқуы:

туа біткен жүрек ақауы

жыныстық жүйелердің жетілуінің ақауы



ішкі ағзалардың жетілмеуі

дененің, аяқ-қолдың құрылымының ауытқуы

ЕСКЕРТУ

Ішімдік жүктілік кезінде жетіліп жатқан ұрық үшін тоғыз ай бойы улы болып саналады!



өздігінен түсік тастау қаупі

уақытынан бұрын босану қаупі

туылғанда нәрестенің салмағының аз және бойының қысқа болуы

бойы мен салмағының (туылғанға дейін және кейін) артта қалуы

ақаулардың дамуы

орталық жүйке жүйесінің бұзылуы



Сыртқы белгілер (беттің пішініне тән)

көздің кішкентай болуы (көз саңлауының қысқалығы)

бастың кішкентай болуы

кеңсіріктің төмен орналасуы мен жалпақ болуы

беттің жалпақтығы

құлақтың төмен орналасып, қалқанында қосымша қыртыстың болуы

мұрын-ерін қатпарының жалпақтануы

үстіңгі еріннің жіңішке болуы (тіпті байқалмауы)

иектің (жетілмеуі) қысқа болуы

мұрынның қысқа (таңқы) болуы

